

Factsheet indicatoren Dutch Head and Neck Audit (DHNA) 2019

DHNA 2019.2

Registratie gestart: 2017 (binnen DICA)

Datum	Versie	Mutatie	Eigenaar
23-03-2018	2019.1	Conceptgids externe indicatoren 2019	DICA
26-11-2018	2019.2	Toevoeging besluitvorming BOT m.b.t. transparantie	DICA

Inclusie en exclusie criteria DHNA

Inclusie

Alle behandelde patiënten met een eerste primaire maligniteit in het hoofd-halsgebied, te weten:

- *Mondholte (ICD-O code: C00, C02-C04, C05.0, C5.8-9, C06.0-8)*
- *Orofarynx (ICD-O code: C01, C05.1- 2, C09, C10.0, C10.2-4, C10.8-9, C14)*
- *Nasofarynx (ICD-O code: C11)*
- *Hypofarynx (ICD-O code: C12-C13)*
- *Larynx (ICD-O code: C32.0-2, C32.8-9, C10.1)*
- *Neusholte en neusbijholten (ICD-O code: C30-C31)*
- *Maligne speekselklieren (ICD-O code: C6.9, C07-C08)*
- *Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-O code: C80)*

Exclusie

1. Carcinoma in situ (CIS).
2. Patiënten die gediagnosticeerd zijn met: een tweede primaire tumor in het hoofd-halsgebied, een recidief of een residu. (CIS tellen niet mee als tweede primaire tumoren.)
3. Mucosale melanomen, schildkliertumoren, huidtumoren, sarcomen, neuro-endocriene tumoren en hematologische maligniteiten.

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron	WV	Transparantie
1	Aantal analyseerbare patiënten geregistreerd in de DHNA.	Structuur	2019	DHNA	NWHHT	Verplicht
2	Multidisciplinair overleg voorafgaand aan behandeling.	Proces	2019	DHNA	NWHHT	Verplicht
3	Start behandeling binnen 30 dagen na eerste consult.	Proces	2019	DHNA	NWHHT	Verplicht

1. Aantal analyseerbare patiënten geregistreerd in de DHNA

Indicator	
Operationalisatie	Aantal analyseerbare* patiënten dat behandeld wordt in verband met een hoofd-halsmaligniteit.
Teller	a. Aantal analyseerbare* patiënten dat curatief behandeld is in verband met een hoofd-halsmaligniteit. b. Aantal analyseerbare* patiënten dat palliatief behandeld is in verband met een hoofd-halsmaligniteit.
Definitie (s)	*Een patiënt is analyseerbaar als ten minste geregistreerd zijn: geboortedatum, opzet van de behandeling en locatie van de tumor.
In-/ exclusiecriteria	Zie DHNA in-/ exclusiecriteria
Norm	-
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

2. Multidisciplinair overleg voorafgaand aan behandeling	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met een primaire hoofd-halsmaligniteit, dat voorafgaand aan de behandeling in een multidisciplinair overleg (MDO) wordt besproken.
Teller	Aantal patiënten dat voorafgaand aan de behandeling in een MDO* is besproken.
Noemer	a. Aantal patiënten dat in opzet curatief behandeld is voor een primaire hoofd-halsmaligniteit. b. Aantal patiënten dat in opzet palliatief behandeld is voor een primaire hoofd-halsmaligniteit.
Definitie (s)	*MDO: Een tenminste 1x per week te houden overleg met alle bij diagnostiek en patiëntbehandeling betrokken zorgverleners, waaruit een onderzoek- en behandeladvies aan de hoofdbehandelaar voortvloeit.
In-/ exclusiecriteria	Zie DHNA in-/exclusiecriteria
Norm	-
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

3. Start behandeling binnen 30 dagen na eerste consult

Indicator	
Operationalisatie	Percentage curatief behandelde patiënten met een hoofd-halsmaligniteit waarbij binnen 30 kalenderdagen na het eerste consult in het eigen ziekenhuis gestart is met de primaire behandeling [^] .
Teller	Aantal patiënten waarbij binnen 30 dagen na het eerste consult de primaire behandeling gestart is.
Noemer	Aantal patiënten dat in opzet curatief behandeld is voor een primaire hoofd-halsmaligniteit.
Definitie (s)	[^] Primaire behandeling: chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie.
In-/ exclusiecriteria	Zie DHNA in-/exclusiecriteria
Norm	-
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019