



## Oplegger indicatorset Parkinson verslagjaar 2016

De indicatorset Parkinson staat voor verslagjaar 2016 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids aangeleverd moeten worden en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. In de indicatorgids zelf staan de definities.

**Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland**

Nummer	Indicatornaam	Datatype
1	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.	Percentage
2	Aantal geregistreerde patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuis.	Subindicator
2a	Aantal geregistreerde patiënten per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose	Aantal
2b	Aantal geregistreerde patiënten per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose	Aantal
2c	Aantal geregistreerde patiënten per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose	Aantal
3	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige.	Subindicator
3a	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige: 0-5 jaar na diagnose	Percentage
3b	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige: 5-	Percentage

	10 jaar na diagnose	
3c	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige: 10 jaar en verder na diagnose	Percentage
4	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat.	Subindicator
4a	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat: DBS	Percentage
4b	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat: duodopa	Percentage
4c	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat: apomorfine	Percentage
7	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) met een ziekenhuisopname per ziekenhuis.	Percentage

Zorginstituut Nederland  
Kwaliteitsinstituut

Datum  
mei 2016

**Onderstaande indicator(en) zijn door het Zorginstituut niet opgenomen op de transparantiekalender voor verslagjaar 2016. Deze indicator(en) kan (kunnen) niet aan ons worden aangeleverd en kan (kunnen) ook niet door het Zorginstituut worden gepubliceerd. Het is wel mogelijk om deze indicator(en) te registeren in de kwaliteitsregistratie.**

Nummer	Indicatornaam
5	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een (heup)fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis.
5.1.a	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose
5.1.b	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose
5.1.c	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose
5.2.a	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose
5.2.b	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose
5.2.c	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose
6	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.
6a	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis: 0-5 jaar na diagnose
6b	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis: 5-10 jaar na diagnose

6c	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis: 10 jaar en verder na diagnose
8	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat gebruik maakt van een mantelzorg/thuiszorg/dagopvang/revalidatie of verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis.
8.1.a	Percentage patiënten dat gebruikt maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang: 0-5 jaar na diagnose
8.1.b	Percentage patiënten dat gebruikt maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang:5-10 jaar na diagnose
8.1.c	Percentage patiënten dat gebruikt maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang: 10 jaar en verder na diagnose
8.2.a	Percentage patiënten dat verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis: 0-5 jaar na diagnose
8.2.b	Percentage patiënten dat verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis:5-10 jaar na diagnose
8.2.c	Percentage patiënten dat verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis: 10 jaar en verder na diagnose
9	Patiëntervaringen van patiënten met de ziekte van Parkinson.
9.1.a	Gemiddelde totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD): 0-5 jaar na diagnose
9.1.b	Gemiddelde totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD): 5-10 jaar na diagnose
9.1.c	Gemiddelde totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD): 10 jaar en verder na diagnose
9.2.a	Gemiddelde score op subschaal Emotionele steun: 0-5 jaar na diagnose
9.2.b	Gemiddelde score op subschaal Emotionele steun: 5-10 jaar na diagnose
9.2.c	Gemiddelde score op subschaal Emotionele steun: 10 jaar en verder na diagnose
9.3.a	Gemiddelde score op subschaal Samenwerking: 0-5 jaar na diagnose
9.3.b	Gemiddelde score op subschaal Samenwerking: 5-10 jaar na diagnose
9.3.c	Gemiddelde score op subschaal Samenwerking: 10 jaar en verder na diagnose
9.4.a	Gemiddelde score op subschaal Toegankelijkheid: 0-5 jaar na diagnose
9.4.b	Gemiddelde score op subschaal Toegankelijkheid: 5-10 jaar na diagnose
9.4.c	Gemiddelde score op subschaal Toegankelijkheid: 10 jaar en verder na diagnose
9.5.a	Gemiddelde score op subschaal Informatievoorziening: 0-5- jaar na diagnose
9.5.b	Gemiddelde score op subschaal Informatievoorziening: 5- 10 jaar na diagnose
9.5.c	Gemiddelde score op subschaal Informatievoorziening: 10 jaar en verder na diagnose
9.6.a	Gemiddelde score op subschaal Participatie: 0-5 jaar na diagnose
9.6.b	Gemiddelde score op subschaal Participatie: 5-10 jaar na diagnose
9.6.c	Gemiddelde score op subschaal Participatie: 10 jaar en verder na diagnose

**Zorginstituut Nederland**  
Kwaliteitsinstituut

**Datum**  
mei 2016

9.7.a	Gemiddelde score op subschaal Bejegening: 0-5 jaar na diagnose
9.7.b	Gemiddelde score op subschaal Bejegening: 5-10 jaar na diagnose
9.7.c	Gemiddelde score op subschaal Bejegening: 10 jaar en verder na diagnose
10	Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8).
10a	Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8): 0-5 jaar na diagnose
10b	Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8): 5-10 jaar na diagnose
10c	Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8): 10 jaar en verder na diagnose
11	Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen.
11a	Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen: 0-5 jaar na diagnose
11b	Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen: 5-10 jaar na diagnose
11c	Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen: 10 jaar en verder na diagnose
12	Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.
12a	Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson: 0-5 jaar na diagnose
12b	Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson: 5-10 jaar na diagnose
12c	Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson: 10 jaar en verder na diagnose
13	Belasting mantelzorg: volhoudtijd.
13a	Belasting mantelzorg: volhoudtijd: 0-5 jaar na diagnose
13b	Belasting mantelzorg: volhoudtijd: 5-10 jaar na diagnose
13c	Belasting mantelzorg: volhoudtijd: 10 jaar en verder na diagnose

**Zorginstituut Nederland**  
Kwaliteitsinstituut

**Datum**  
mei 2016

## Colofon

### Internet

- OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): <https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ>
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: [www.nvz-ziekenhuizen.nl](http://www.nvz-ziekenhuizen.nl)
- Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: [www.nfu.nl](http://www.nfu.nl)
- Zelfstandige Klinieken Nederland: [www.zkn.nl](http://www.zkn.nl)
- Zorginstituut Nederland: <http://www.zorginzicht.nl>

### Gegevensaanlevering

Zorginstellingen leveren vrijwillig en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen.

# Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016

Registratie gestart: 2015

## Inclusiecriteria

### Inclusie

Alle patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 501)

### Exclusie

- Patiënten met een andere Parkinsonisme (DBC502)
- Patiënten jonger dan 18 jaar

## Indicatorenoverzicht

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron
1	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.	Proces	2016	DPIA
2.	Aantal patiënten onder behandeling per ziekenhuislocatie en per type patiënten	Structuur	2016	DPIA
3.	Percentage geregisteerde patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (thuisconsult/telefonisch contact/email contacten/of consult).	Proces	2016	DPIA
4.	Percentage patiënten met een complexe behandeling (DBS, duodopa, apomorfine)	Proces	2016	DPIA
5.	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een (heup)fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis.	Uitkomst	2016*	DPIA
6.	Percentage valincidenten met letsel bij patiënten met Parkinson per ziekenhuis	Uitkomst	2016*	DPIA PROMS
7.	Percentage ziekenhuisopnames per ziekenhuis	Uitkomst	2016*	DPIA
8.	Zelfstandigheid (gebruik thuiszorg, verzorgingstehuis, verblijf verpleeghuis, mantelzorg, dagopvang en revalidatie)	Uitkomst	2016*	PROMS
9.	Patiëntervaringen van patiënten met ziekte van Parkinson	Uitkomst	2016*	PROMS
10.	PDQ-39 (inclusief PDQ-8) bij patiënten met de ziekte van Parkinson	Uitkomst	2016*	PROMS
11.	Functionele status: mate van beweging bij patiënten met de ziekte van Parkinson	Uitkomst	2016*	PROMS
12.	Arbeids- en sociale participatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson	Uitkomst	2016*	PROMS
13.	Belasting van mantelzorg bij patiënten met de ziekte van Parkinson	Uitkomst	2016*	PROMS

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 1. Volledigheid

1. Volledigheid	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.
Teller	Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig* is.
Noemer	Aantal ingevoerde patiënten in de DPIA.
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson. *Volledig: Analyseerbare^ patiënten waarbij alle items die nodig zijn voor het berekenen van de externe indicatoren (dementie, toestemming PROMS, ziekenhuisopname, heupfractuur). ^ Analyseerbaar: minimaal vereiste items zijn: geboortedatum, consultdatum en indien van toepassing: diagnose, datum eerste DBC/jaar van diagnose.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag:	01-01-2016 t/m 31-12-2016

## 2. Aantal patiënten ziekenhuis

2. Aantal patiënten ziekenhuis	
Indicator	
Operationalisatie	Aantal geregistreerde patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) per ziekenhuis.
	Aantal geregistreerde patiënten (per fase) per ziekenhuis.
	Aantal fasen: a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënt met (verdenking op) de ziekte van Parkinson.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

### 3. Gespecialiseerd verpleegkundige

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige.
Teller	Aantal patiënten met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een parkinsonverpleegkundige.
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson.
In-/ exclusiecriteria	Emailcontact in ruimste zin van het woord. Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

### 4. Complexe behandeling

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling ondergaat.
Teller	a. Aantal patiënten met DBS b. Aantal patiënten met duodopa c. Aantal patiënten met apomorfine
Noemer	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie.
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson Onder complexe behandeling wordt een behandeling met DBS, duodopa, apomorfine verstaan.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016



## 5. Fracturen

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een (heup)fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis.
Teller 1	Aantal patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per ziekenhuis.
Noemer 1	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie. 1a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 1b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 1c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 2	Aantal patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per ziekenhuis.
Noemer 2	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie. 2a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 2b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 2c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 6. Valincident

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.
Teller	Aantal patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis.
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte van Parkinson fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte van Parkinson fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte van Parkinson fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson Definitie van letsel: letsel waarvoor medische hulp is ingeroepen.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvoer	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 7. Ziekenhuisopname

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) met een ziekenhuisopname per ziekenhuis.
Teller	Aantal patiënten met een ziekenhuisopname per ziekenhuis.
Noemer	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie.
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson.
In-/ exclusiecriteria	Exclusie: electieve DBS opname, zie verder in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvoer	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 8. Mantelzorg, thuiszorg of dagopvang

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat gebruikt maakt van een mantelzorg/thuiszorg/dagopvang/validatie of verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis.
Teller 1	Aantal patiënten dat gebruik maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang.
Noemer 1	1a. Aantal patiënten met ziekteduur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 1b. Aantal patiënten met ziekteduur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 1c. Aantal patiënten met ziekteduur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 2	Aantal patiënten dat verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis.
Noemer 2	2a. Aantal patiënten met ziekteduur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 2b. Aantal patiënten met ziekteduur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 2c. Aantal patiënten met ziekteduur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	De definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid luidt: " <i>Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.</i> " Het Sociaal Cultureel Planbureau voegt daar nog iets aan toe: " <i>Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.</i> "
In-/exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 9. Cqi

9. Cqi	
Indicator	
Operationalisatie	Patiëntervaringen van patiënten met de ziekte van Parkinson.
Teller 1	Totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD).
Noemer 1	1a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 1b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 1c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 2	Subschaal Emotionele steun.
Noemer 2	2a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 2b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 2c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 3	Subschaal Samenwerking.
Noemer 3	3a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 3b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 3c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 4	Subschaal Toegankelijkheid.
Noemer 4	4a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 4b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 4c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 5	Subschaal Informatievoorziening.
Noemer 5	5a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 5b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 5c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 6	Subschaal Participatie.
Noemer 6	6a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose 6b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 6c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Teller 7	Subschaal Bejegening.
Noemer 7	7a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose

	7b. Aantal patiënten met ziekteduur fase 2: 5-10 jaar na diagnose 7c. Aantal patiënten met ziekteduur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA
Commentaar	Tweemaal per jaar worden er vragenlijsten naar de patiënt gestuurd, eenmaal voor patiëntervaringen en eenmaal voor het zorggebruik.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 10. PDQ-39

10. PDQ-39	
Indicator	
Operationalisatie	Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8).
Teller	Gemiddelde score op PDQ-39 (inclusief PDQ8).
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	<p>PDQ39 is een meetinstrument en is onderverdeeld in 8 subcategorieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobility (10, #1-10)</li> <li>• Activities of daily living (ADL) (6, #11-16)</li> <li>• Emotional well-being (6, #17-22)</li> <li>• Stigma (4, #23-26)</li> <li>• Social support (3, #27-29)</li> <li>• Cognition (4, #30-33)</li> <li>• Communication (3, #34-36)</li> <li>• Bodily discomfort (3, #37-39)</li> </ul>
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 11. Bewegen

11. Bewegen	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen.
Teller	Aantal patiënten dat voldoet aan de TNO-norm voor gezond bewegen.
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA
Commentaar	Voor deze indicator zal de squash lijst worden gebruikt.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 12. Sociale en arbeidsparticipatie

12. Sociale en arbeidsparticipatie	
Indicator	
Operationalisatie	Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.
Teller	Aantal patiënten met betaald werk* Totale score op participatieladder.
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekteduur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekteduur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekteduur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	Niveau 6: betaald werk / Niveau 5: betaald werk met ondersteuning / Niveau 4: onbetaald werk / Niveau 3: deelname aan sociale activiteiten (cursus, vereniging) / Niveau 2: sociale contacten buitenshuis Niveau 1: geïsoleerd.
In-/ exclusiecriteria	Inclusiecriteria: patiënten jonger dan 65 kijken naar betaald werk. Zie verder in- en exclusiecriteria van DPIA
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.

## 13. Mantelzorg belasting

13. Mantelzorg belasting	
Indicator	
Operationalisatie	Belasting mantelzorg: volhoudtijd.
Teller	Score op MCSi.
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekteduur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekteduur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekteduur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	Zie verder in- en exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2016 t/m 31-12-2016

\* de uitkomstindicatoren worden uitgevraagd over 2016 mits geen wettelijke verplichting tot transparant maken vanuit het Zorginstituut Nederland.