

Toetstabel | Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018

| Operationalisatie | Aard van de wijziging | Criteria Toetsingskader | Advies werkgroep | PFN | FMS | V&VN | ZN | NVZ | NFU | ZKN | |
|--------------------------|---|--|-----------------------|--|---|---------|---------|---|---|---------|--|
| Indicator 1, 2 | | DAPA Factsheet | | | | | | | | | |
| Volume | | Criterion 1 t/m 5 | Niet transparant | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | |
| Overweging ZIN | Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over. DAPA is niet gevuld. | | | | | | | | | | |
| Advies ZIN | Niet transparant | | | | | | | | | | |
| Indicator 1 | | Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) van de Patiëntenfederatie | | | | | | | | | |
| Looptraining | | Criterion 1 t/m 4 | Verplicht transparant | Verplicht transparant. In de werkgroep is besproken dat dit een relevante en belangrijke indicator is en was iedereen het eens over verplicht. De definitie in de PAV gids is nu conform de DAPA gids. Deze indicator is belangrijk voor het PAV keurmerk. | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Vrijwillig transparant. | Vrijwillig Transparant | Akkoord | |
| | | Criterion 5 | Verplicht transparant | | | | | VRIJWILLIG Deze indicator zit in de registratie van de DAPA gebouwd. Deze DAPA-indicator is overgenomen in deze algemene PAV-gids. Dit is niet bezwaarlijk, maar tijdens het overleg van de DAPA tijdens de DICA-dagen, bleek er geen consensus te bestaan over deze indicator. Ook bleken later de benodigde variabelen niet in het ZIS te worden vastgelegd, waardoor deze indicator niet volgens de gestelde definitie van de DAPA is aan te leveren uit het ZIS. Op dit moment is er geen vertrouwen in het feit of de indicator aan te leveren is. Het voorstel is om deze vrijwillig op te nemen om te zien of de indicator uit het ZIS is te halen. Een jaar later zou hij via de DAPA kunnen worden uitvoeraad. | im Registratie- en aanleverproblemen bij DAPA. Samenvoegen DAPA en PAV wenselijk. | | |
| Overweging ZIN | Er is consensus in de werkgroep over de relevantie van de indicator. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Na de registratietoets en in de autorisatiefase geven NVZ en NFU aan dat er registratieproblemen zijn, dan wel sprake is van registratielast. Conform dit proces adviseert het Zorginstituut om deze indicator vrijwillig transparant te maken. In de gids duidelijk vermelden dat het vrijwillig is, maar als je in aanmerking wil komen voor het keurmerk dan is dit een essentiële indicator. | | | | | | | | | | |
| Advies ZIN | Vrijwillig transparant | | | | | | | | | | |
| Indicator 2 t/m 6 | | Criterion 1 t/m 5 | akkoord | Akkoord | Akkoord indicator 2: Zoals tijdens de commentaarroonde ook door NIV aangegeven verzoekt zij een aantal formuleringen van antwoordmogelijkheden te | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | |
| Overweging ZIN | Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over. | | | | | | | | | | |
| Advies ZIN | Verplicht transparant | | | | | | | | | | |

Factsheet Indicatoren perifeer arterieel vaatlijden (DAPA)

DAPA 2018.1

Registratie gestart: 1 april 2016

| Datum | Versie | Mutatie | Eigenaar |
|------------|--------|--|----------|
| 23-06-2017 | 2018.1 | <u>Aanpassingen conform indicatoredagen juni 2017</u> Concept indicatoren verslagjaar 2018 | DICA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Met opmaak: Lettertype: +Hoofdtypekst (Calibri)

Inclusie & exclusie criteria DAPA

Inclusie

1. Claudicatio intermittens (CI) ([conservatief of interventie](#))(~~looptraining of operatieve behandeling~~)
2. Kritieke ischemie (KI) ([conservatief of interventie](#))(~~looptraining of operatieve behandeling~~)
3. Patiënten die 16 jaar en ouder zijn
4. Poliklinische en klinische ziekenhuiszorg

Exclusie

- ~~1.~~ De patiënten met acute ischemie (AI), diagnosecode 417 worden geëxcludeerd.
- ~~2.~~ ~~Patiënten die overleden zijn.~~

Met opmaak: Patroon: Doorzichtig

Met opmaak: Patroon: Doorzichtig

Overzicht indicatoren DAPA

| Nr. | Indicator | Type indicator | Uitvraag over (jaar) | Bron |
|-----|---|---------------------------------|----------------------|------|
| 1. | Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd met claudicatio intermittens, rustpijn of <u>kritieke ischemie</u> <u>weefselverlies</u> , ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden. | Structuur | 2018 | DAPA |
| 2. | Percentage patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden, dat looptraining heeft gehad voorafgaand aan een vasculaire interventie/ingreep. | ProcesStructuur | 2018 | DAPA |

| 1. Volume | |
|--------------------------|---|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met claudicatio intermittens, rustpijn of weefselverlies, kritieke ischemie , ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden. |
| Teller A | Totaal Aantal Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met claudicatio intermittens, rustpijn of weefselverlies, kritieke ischemie ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden. |
| Teller B | Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met claudicatio intermittens ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden. |
| Teller C | Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met rustpijn ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden. |
| Teller D | Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met weefselverlies ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden. |
| Definitie (s) | - |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DAPA in -/ exclusiecriteria |
| Norm | - |
| Uitvraag over periode | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 |

Notulen Indicatorendagen 2017

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| Conclusie: | Valide: Jaxxx | Transparantie: Neexxx | Advies t.a.v. verplichte transparantie: n.v.t. xxx |
| Commentaar: | xxx | | |

Tabel met opmaak

| 2. Looptraining | |
|-----------------------|---|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Percentage patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden, dat looptraining* heeft gehad voorafgaand aan een vasculaire interventie/ingreep**. |
| Teller | Aantal patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden, dat looptraining* heeft gehad voorafgaand aan een vasculaire interventie/ingreep**. |
| Noemer | Totaal Aantal patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden, dat een vasculaire interventie/ingreep** ondergaat. |
| Definitie (s) | * Looptraining: gesuperviseerde looptraining gedurende tenminste drie maanden. ** V asculaire interventie/ ingreep: percutaan (wel of niet met stent) en/of chirurgisch (endarterectomie of bypass). |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DAPA in -/ exclusiecriteria |
| Norm | - |
| Uitvraag over periode | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 |

| Notulen Indicatorendagen 2017 | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Conclusie: | Valide: Ja*** | Transparantie: Nee*** | Advies t.a.v. verplichte transparantie: n.v.t.*** |
| Commentaar: | X*** | | |