

Indicatorenset DPARD

Uitvraag ziekenhuizen/ZBC's over verslagjaar 2021

Versie, 2021.1

Meer informatie op:
www.transparantieportaal.nl
www.dica.nl
www.zorginzicht.nl

Samengesteld door:
Diabetesvereniging Nederland
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
V&VN Diabeteszorg
Patiëntenfederatie Nederland
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Zorgverzekeraars Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland

Contactinformatie:
DICA
indicatoren@dica.nl

Deze indicatorset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Vrijwillige en verplichte indicatoren worden aangeleverd via het door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal (gegevensmakelaar). Die faciliteert de route (aanlevering en publicatie) voor verplichte transparantie. De verplicht aangeleverde gegevens worden door Zorginstituut Nederland gepubliceerd.

Inhoud

1	Overzicht indicatoren	3
2	Algemene informatie	4
2.1	Uitgangspunten	4
2.2	Populatiebepaling	4
2.3	Aanlevering van de gegevens	5
2.4	Indicatorenwerkgroep	5
3	Indicatoren	6
4	Wijzigingstabel	15
5	Bijlage: toelichting op informatie per indicator	16

1 Overzicht indicatoren

Indicator-nummer	Indicatornaam	Bron¹	Transparantie?²
1	Voetzorg volwassenen	DPARD/EPD	Vrijwillig
2	HbA1c kinderen	DPARD/EPD	Verplicht
3	Acute opnames kinderarts	EPD	Verplicht
4	Volume kinderarts	DPARD/EPD	Verplicht
5	Insulinepomp therapie	DPARD/EPD	Verplicht
6	Bevorderen zelfmanagement	DPARD/EPD	Verplicht

¹ Vul hier de bron van de indicator in (bijvoorbeeld kwaliteitsregistratie X, EPD, ZIS, etc.)

² Vrijwillige indicatoren worden niet opgenomen op de Transparantiekalender en dus niet aangeleverd aan en gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. Vrijwillige indicatoren worden gedeeld met de Zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties en orgaanbieders

2 Algemene informatie

2.1 Uitgangspunten

De indicatoren zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen. De ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om zich bij de Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD) aan te sluiten. Initiatiefnemers zijn de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). De DPARD is op dit moment onder beheer van DICA. De informatie van indicatoren 1, 2, 4, 5 en 6 vallen als een ziekenhuis is aangesloten bij de DPARD direct door te leveren aan het transparantieportaal.

2.2 Populatiebepaling

De eerste stap in het bepalen van de indicatoren is het vaststellen van de populatie. Voor de indicatorensets was als uitgangspunt gekozen om de populatie te bepalen aan de hand van de DOT.

Diabetes Volwassenen

De populatie bestaat uit het aantal patiënten dat op enig moment in het verslagjaar een DOT heeft die voldoet aan:

- Variabele D1 (betekent automatisch dat het patiënten met diabetes zijn en dat ze onder behandeling zijn van de internist). Hierbij gaat het om een combinatie van onderstaande onderdelen:

Zorgtype	21 vervolg
Diagnoses	221 DM znd secundaire complicaties
	222 DM met secundaire complicaties
	223 DM chronische pomptherapie

- Het gaat om volwassen patiënten. Voor kinderen die in het ziekenhuis behandeld worden opent de kinderarts een DOT. Als er een internistische DOT geopend is mag er van worden uitgegaan dat het gaat om volwassen patiënten.
- Inclusie/exclusiecriteria zoals benoemd in de factsheets.
- Patiënten 1 keer tellen: de telling gebeurt aan de hand van vastgestelde DBC-codes:
 - Dit gebeurt niet per diagnose, maar voor alle drie de diagnose DOTs. Als een patiënt bijvoorbeeld diagnose 221 en 222 heeft, dan dient deze 1 keer geteld te worden.
 - Indien een patiënt 2 DOTs heeft met dezelfde diagnose, dan dient deze 1 keer geteld te worden.
 - 'Lege DBC's' moeten niet meegeteld worden. Er moet een (al dan niet declarabele) verrichting zijn geweest binnen de DBC om de patiënt mee te mogen tellen voor de betreffende indicator.

Diabetes Kinderen

De populatie voor de indicatorenset Diabetes Kinderen bestaat uit het aantal patiënten dat op enig moment in het verslagjaar een DOT heeft die voldoet aan:

- Specialisme code 316 (patiënten onder behandeling van de kinderarts).
- Diagnose code 7113 (diabetes mellitus met chronische pomptherapie) óf 7114 (diabetes mellitus overig)
- Inclusie/exclusiecriteria zoals benoemd in de factsheets.
- Patiënten één keer tellen: de telling gebeurt aan de hand van vastgestelde DOT-codes:
 - Dit gebeurt niet per diagnose, maar voor alle twee de diagnose DOTs. Als een patiënt meerdere diagnoses heeft, dan dient deze één keer geteld te worden
 - Indien een patiënt 2 DOTs heeft met dezelfde diagnose, dan dient deze één keer geteld te worden.
- Patiënten worden soms gestratificeerd in twee leeftijdsgroepen:
 - (1) Patiënten ≤ 18 jaar
 - (2) Patiënten > 18 jaar

De populatie wordt uiteindelijk bepaald door de in het verslagjaar afgesloten DOT, tenzij anders staat vermeld bij de indicator.

2.3 Aanlevering van de gegevens

Via www.zorginzicht.nl is het processchema te raadplegen voor de aanlevering van de gegevens behorende bij de indicatoren.

2.4 Indicatorenwerkgroep

De werkgroep voor het onderhoud van de indicatorset DPARD bestond in 2020 uit de volgende personen:

DVN	Mw. E. Barents, beleidsadviseur
FMS	Mw. E. de Goeij, beleidsadviseur
NVK	Mw. J. Schermer, kinderarts
NIV	Dhr. T. van Bommel, internist
	Dhr. H.J.G. Bilo, internist
	Dhr. J.J.J. de Sonnaville, internist
	Dhr. G. Mantjes, beleidsadviseur
NVK	Mw. J. Schermer, kinderarts
NVZ	Dhr. S. van Aalst, beleidsadviseur
PFN	Dhr. B. van Bruggen, beleidsadviseur
V&VN	Mw. A. Steger
V&VN	Mw. Y. Bouten-Siebers
V&VN-diabeteszorg	Mw. B. Pagrach
ZIN	Mw. B. M. Roede, adviseur
ZN	Mw. L. Vunderink, beleidsadviseur
	Mw. B. Uhlenhop, adviserend geneeskundige

3 Indicatoren

Indicatornaam	Voetzorg volwassenen
Indicatornummer	1
Operationalisatie	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder poliklinische behandeling van een internist, waarbij voetonderzoek heeft plaatsgevonden.
Informatie voor cliënten	De indicator streeft naar een situatie waarin bij patiënten met diabetes mellitus onder poliklinische behandeling van een internist een voetonderzoek plaatsvindt.
Transparantie	Vrijwillig
Type indicator	Proces
Relevantie	Perifere neuropathie en perifere arterieel vaatlijden, al dan niet gecombineerd met standsafwijkingen van de voeten, kunnen aanleiding geven tot invaliderende voetproblemen bij patiënten met diabetes mellitus. Georganiseerde voetzorg en jaarlijks voetonderzoek zijn als onderdeel van de complicatie-screening bij patiënten met diabetes mellitus van belang om (ernstige) voetulcera te voorkomen, het aantal ziekenhuisopnames te verminderen en amputaties (van een deel) van de voet te voorkomen. NB: het voetonderzoek kan worden uitgevoerd door een zorgprofessional (bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige) en hoeft niet door een internist te zijn gedaan.
Datatype	Percentage
Bron (achtergrond) van de indicator	DPARD/EPD
Rekenregels en definities	
Teller	Aantal patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van een internist, waarbij voetonderzoek* heeft plaatsgevonden in het ziekenhuis in het verslagjaar.
Noemer	Aantal patiënten met de diagnose diabetes mellitus onder poliklinische behandeling van de internist.
Antwoordopties	Percentage; één antwoord mogelijk
Definitie	*Voetonderzoek: onderzoek op standsafwijkingen, inspectie schoeisel, onderzoek op aanwezigheid van neuropathie en ischemie. NB: het voetonderzoek hoeft niet door een internist te zijn gedaan. Het kan ook zijn uitgevoerd door een andere zorgprofessional (bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige).
In-/exclusiecriteria	Inclusie: volwassen patiënten met diabetes, die poliklinisch onder behandeling zijn bij de internist in het hele verslagjaar. Het gaat om patiënten met zorgtype 21. Exclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Volwassen patiënten met diabetes met alleen een klinisch consult door de internist, dan wel een eenmalig poliklinisch consult om welke reden dan ook (vraag zorggroep, preoperatief consult, etc.). • "Lege DBC's" worden niet meegenomen. • Patiënten met een nieuwe DOT (zorgtype 11) worden

	geëxcludeerd.
Databron (registratie)	DPARD/EPD/DOT-registratie
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicator naam	HbA1c kinderen
Indicator nummer	2
Operationalisatie	HbA1c kinderen en patiënten onder behandeling van de kinderarts.
Informatie voor cliënten	De indicator geeft inzicht in een zo optimaal mogelijke van bloedsuikers van patiënten met diabetes.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Uitkomst
Relevantie	Het doel van de diabetesbehandeling is het voorkomen korte- en lange termijn complicaties van diabetes mellitus door o.a. een zo optimaal mogelijke regulatie van de bloedsuikers van patiënten met diabetes. Regelmatige monitoring van de mate van diabetesregulatie is essentieel om het proces van zorgverlening tijdig bij te kunnen sturen.
Datatype	Percentage
Bron (achtergrond) van de indicator	DPARD/EPD
Rekenregels en definities	
Teller A	Aantal kinderen met diabetes ≤ 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c* < 58 mmol/mol.
Teller B	Aantal patiënten met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c* < 58 mmol/mol.
Teller C	Aantal kinderen met diabetes ≤ 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c* > 86 mmol/mol.
Teller D	Aantal patiënten met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c* > 86 mmol/mol.
Noemer A	Aantal kinderen met diabetes ≤ 18 jaar onder behandeling van de kinderarts.
Noemer B	Aantal patiënten met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts.
Noemer C	Aantal kinderen met diabetes ≤ 18 jaar onder behandeling van de kinderarts.
Noemer D	Aantal patiënten met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts.
Antwoordopties	Percentage; één antwoord mogelijk
Definitie	*Laatst gemeten HbA1c: de HbA1c waarde die op het moment van meten als laatste in de status wordt aangetroffen.
In-/exclusiecriteria	Inclusie: kinderen en patiënten met diabetes > 18 jaar met zorgtype 21 (deze vallen automatisch onder DOT van de kinderartsen; volwassenen hebben een aparte DOT). Exclusie: kinderen en patiënten met diabetes > 18 jaar met een nieuwe DOT (zorgtype 11).
Databron (registratie)	DPARD/EPD/DOT-registratie

Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicatornaam	Acute opnames kinderarts
Indicatornummer	3
Operationalisatie	Aantal diabetes gerelateerde acute opnames van kinderen en patiënten onder behandeling van de kinderarts.
Informatie voor cliënten	De indicator geeft inzicht in het aantal acute opnames, die in een geval van goede zorg zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Uitkomst
Relevantie	De indicator geeft inzicht in het aantal acute opnames, die in een geval van goede zorg zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden.
Datatype	Aantal
Bron (achtergrond) van de indicator	EPD
Rekenregels en definities	
Teller A	Aantal diabetes gerelateerde acute opnames van kinderen, onder behandeling op de eigen klinische locatie, op een ziekenhuislocatie in het verslagjaar.
Teller B	Aantal kinderen ≤ 18 jaar, onder behandeling op de eigen ziekenhuislocatie, dat één of meerdere diabetes gerelateerde acute opnames had in het verslagjaar
Teller C	Aantal patiënten > 18 jaar, onder behandeling van de kinderarts op de eigen ziekenhuislocatie, dat één of meerdere diabetes gerelateerde acute opnames had in het verslagjaar
Antwoordopties	Aantal; één antwoord mogelijk
Definitie	*Diabetes gerelateerde acute opname: acute opname in verband met diabetische ketoacidose (DKA).
In-/exclusiecriteria	Inclusie: Patiënten met zorgtype 21. Exclusie: Patiënten met zorgtype 11.
Databron (registratie)	EPD/DOT-registratie
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicatornaam	Volume kinderarts
Indicatornummer	4
Operationalisatie	Volume kinderen en patiënten onder behandeling van de kinderarts.
Informatie voor cliënten	Indicator zorgt voor inzicht in het aantal patiënten die door kinderartsen wordt behandeld.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Proces
Relevantie	Om zorg adequaat te kunnen leveren en te waarborgen is inzicht nodig in prevalentiecijfers van het aantal patiënten onder behandeling.
Datatype	Aantal
Bron (achtergrond) van de indicator	DPARD/EPD
Rekenregels en definities	
Teller	Aantal kinderen en patiënten >18 jaar die op de ziekenhuislocatie behandeld door het kinderdiabetesteam.
Antwoordopties	Aantal; één antwoord mogelijk
In-/exclusiecriteria	Inclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Bij het vaststellen van de populatie gaan het om de onderstaande DOT-codes binnen specialismecode 316 (kindergeneeskunde): zorgtype 11 reguliere zorg; 21 vervolg & diagnoses 7113 Diabetes mellitus met chronische pomptherapie; 7114 Diabetes mellitus overig. • Inclusief behandelingen door coassistenten, ANIOS en AIOS.
Databron (registratie)	DPARD/EPD/DOT-registratie
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicatornaam	Insulinepomp therapie
Indicatornummer	5
Operationalisatie	Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, behandeld met insulinepompthherapie.
Informatie voor cliënten	Deze indicator laat zien welk deel van de patiënten met diabetes insulinepompthherapie krijgt en of daar in het verslagjaar mee gestart is.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Proces
Relevantie	Een groot aantal partijen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van insulinepompthherapie en hulpmiddelen. Op dit moment worden de kwaliteitscriteria geïmplementeerd. Voor patiënten met diabetes mellitus is het belangrijk dat de geboden kwaliteit bij insulinepompthherapie inzichtelijk is. Deze indicator laat zien welk deel van de patiënten met diabetes insulinepompthherapie krijgt en of daar in het verslagjaar mee gestart is. De indicator moet nadrukkelijk worden gezien in samenhang met andere vragen, zoals de 24-uurs bereikbaarheid van een diabetesteam.
Datatype	Aantal
Bron (achtergrond) van de indicator	DPARD/EPD
Rekenregels en definities	
Teller A	Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, behandeld met insulinepompthherapie*.
Teller B	Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, in verslagjaar 2021 gestart met insulinepompthherapie*.
Teller C	Aantal kinderen en patiënten >18 jaar en onder behandeling zijn van de kinderarts met diabetes mellitus, in behandeld met insulinepompthherapie*.
Antwoordopties	Aantal; één antwoord mogelijk
Definitie	*Een insulinepomp is een klein, draagbaar apparaatje dat 24 uur per dag snelwerkende insuline subcutaan toedient. De pomp geeft de insuline af via een dun slangetje en een canule (samen "infusieset" genoemd), die vlak onder de huid in buik, dij of bil is ingebracht. De gebruiker kan de af te geven hoeveelheid insuline aanpassen. NB: Real Time Glucose Monitoring valt hier niet onder.
In-/exclusiecriteria	Inclusie volwassenen: Om te bepalen hoeveel volwassenen insulinepompthherapie krijgen, gelden de onderstaande DOT-codes binnen specialismecode 313 (Interne geneeskunde): zorgtype 11 reguliere zorg; 21 vervolg & diagnoses 223 DM chronische pompthherapie. Inclusie kinderen: Om te bepalen hoeveel kinderen en patiënten >18 jaar onder behandeling van de kinderarts insulinepompthherapie krijgen, gelden de onderstaande DOT-codes binnen specialismecode 316

	(kindergeneeskunde): zorgtype 11 reguliere zorg; 21 vervolg & diagnoses 7113 diabetes mellitus met chronische pomptherapie. Algemeen: Inclusief behandelingen door coassistenten, ANIOS en AIOS.
Databron (registratie)	DPARD/EPD/DOT-registratie
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

Indicatornaam	Bevorderen zelfmanagement
Indicatornummer	6
Operationalisatie	Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, maken gebruik van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM) & of hiermee aan de ervaringsnorm wordt voldaan.
Informatie voor cliënten	Indicator geeft inzicht over het aantal patiënten behandeld met RTCGM, en inzicht in de ervaring van specialisten die kinderen behandelen.
Transparantie	Verplicht
Type indicator	Proces & structuur
Relevantie	Indicator geeft inzicht over het aantal patiënten behandeld met RTCGM, en inzicht in de ervaring van specialisten die kinderen behandelen.
Datatype	Aantal
Bron (achtergrond) van de indicator	DPARD
Rekenregels en definities	
A : Teller	Aantal patiënten met diabetes mellitus, die onder behandeling zijn van de internist, maken gebruik van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM)*.
B : Normhantering	Voldoet u hiermee aan de ervaringsnorm voor het behandelen van kinderen met diabetes met Real Time Glucose Monitoring*?
Antwoordopties	Aantal en ja/nee; één antwoord mogelijk
Definitie	*Ingezet volgens de landelijke indicatiestelling met voorwaarden gesteld aan goed gebruik (behandelplan). Het gaat hierbij niet om diagnostische inzet en ook niet om Flash Glucose Monitoring. 223 DM chronische pomptherapie.
In-/exclusiecriteria	Inclusie: <ul style="list-style-type: none"> • Kinderen en patiënten met diabetes met zorgtype 21 (deze vallen automatisch onder DOT van de kinderartsen; volwassenen hebben een aparte DOT). • Inclusief behandelingen door coassistenten, ANIOS en AIOS. Exclusie: Kinderen en patiënten met diabetes met een nieuwe DOT (zorgtype 11).
Databron (registratie)	DPARD/EPD/DOT-registratie
Meetperiode	01-01-2021 t/m 31-12-2021
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Aanleverniveau	Locatieniveau

4 Wijzigingstabel

Wijzigingstabel ten opzichte van de gids van verslagjaar 2020

- Geen wijzigingen -

Indicator	Wijziging

5 Bijlage: toelichting op informatie per indicator

Operationalisatie	De indicator in één korte zin omschreven. Let op: vermeld duidelijk de eenheid van de indicator in deze zin. Bijvoorbeeld: 'wachtijd in dagen'.
Informatie voor cliënten	Het belang van en de betekenis van de indicator wordt hier kort zonder vaktermen verwoord. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg wat iets kan zeggen over de kwaliteit van zorg. In de informatie van cliënten wordt beknopt omschreven wat de indicator betekent en hoe deze geïnterpreteerd moet worden ('lager is beter', 'een instelling moet onder de norm van X scoren').
Transparantie	<ul style="list-style-type: none"> - verplicht (publicatie in Openbare Database van Zorginstituut Nederland) - vrijwillig (geen openbare publicatie. Doorlevering alleen naar patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders)
Type indicator	<ul style="list-style-type: none"> - Uitkomst - Proces - Structuur
Relevantie	Geef aan waarom de indicator relevant is en voor wie.
Datatype	Het datatype dat moet worden aangeleverd: <ul style="list-style-type: none"> - tekst (vrije tekst of een keuze uit een lijst in de indicatorgids) - ja/nee - aantal (een geheel getal) - getal - percentage (een getal tussen 0 en 100. Teller/noemer *100)
Bron (achtergrond) van de indicator	Op basis waarvan is de indicator opgesteld? Verwijs naar een richtlijn/standaard, of een internationale indicatorset waarin de indicator ook is opgenomen. Dit vergroot de validiteit van de indicator: zegt deze indicator echt iets over kwaliteit van zorg?
Rekenregels en definities	
Teller(s)	Het getal boven de streep van een breuk. De teller is altijd een deelverzameling van de noemer. Om lange formuleringen te vermijden, is de volledige omschrijving van de deelverzameling niet altijd herhaald in de teller.
Noemer	Het getal onder de streep van een breuk. Nauwkeurige beschrijving van de cliëntenpopulatie. Indien er sprake van een structuurindicator is, dan is noemer niet van toepassing.
Vraag	Wanneer er een vraag wordt gesteld over de organisatie van de zorg (vaak een klantpreferentievraag), dan kan de vraag aan de instelling hier geplaatst worden. De operationalisatie is dan hoe de indicator wordt gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Vraag: "Op welke manier kunnen patiënten na de operatie

	contact opnemen bij vragen?" Operationalisatie: "Aangeboden manieren postoperatief contact"
Antwoordopties	Bij vragen is het belangrijk aan te geven of er slechts één antwoord mogelijk is of meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast moeten de antwoordopties vermeld worden.
Definitie	Indien in de indicator termen worden gebruikt die enige toelichting nodig hebben, zodat betrouwbaar kan worden geregistreerd, dan wordt een definitie gegeven.
In- /exclusiecriteria	Een duidelijke definiëring van de cliëntenpopulatie vertaalt zich uiteindelijk in duidelijke in- en exclusiecriteria. Daarnaast kunnen exclusiecriteria gebruikt worden om vergelijkbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld als bepaalde cliëntengroepen niet gelijk over instellingen zijn verdeeld.
Casemix	Wanneer het relevant is voor een indicator kunnen cliëntkenmerken gebruikt worden voor het corrigeren van de indicatorwaarde. Hier moet worden aangegeven of er een casemixcorrectie plaatsvindt en op welke variabelen.
Databron (registratie)	De te gebruiken bron voor het berekenen van de indicatorwaarde. Bijvoorbeeld: LROI, NKR, DLCA-R, EPD, Zorgkaart Nederland
Norm	Als de indicator een norm kent, wordt deze hier in de indicatorgids vermeld. Ook de bron van de norm wordt vermeld.
Meetperiode	De meetperiode is de periode waarin de metingen worden gedaan. Dit is standaard het hele kalenderjaar (01-01 t/m 31-12), maar hier kan van worden afgeweken. Bij follow-upmetingen moet een expliciete keuze worden gemaakt: een meting drie maanden postoperatief binnen het verslagjaar betekent dat de operatie ook in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar kan zijn uitgevoerd. Soms wordt er een peildatum gebruikt in plaats van een meetperiode (vaak bij structuurindicatoren). De peildatum ligt dan vaak op 01-03 van het jaar ná het verslagjaar.
Aanleverfrequentie	De frequentie waarmee de indicatoren aangeleverd worden. Afspraken over de frequentie worden landelijk gemaakt. Dit is momenteel één keer per jaar.
Aanleverniveau	Het niveau waarop de indicatoren worden aangeleverd; in beginsel worden alle indicatoren op locatieniveau aangeleverd. In de uitgangspunten in de indicatorgids wordt voor de hele set aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan. Per indicator kunnen specifieke aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld voor proces- en uitkomstindicatoren afkomstig uit kwaliteitsregistraties op concernniveau.