

# Indicatorenset

## Heupfracturen - DHFA

Uitvraag ziekenhuizen/ZBC's over verslagjaar 2026

Versie 2026.1, juni 2025

Meer informatie op:

- [www.transparantieportaal.nl](http://www.transparantieportaal.nl)
- [www.dica.nl](http://www.dica.nl)
- [www.zorginzicht.nl](http://www.zorginzicht.nl)

Samengesteld door:

Organisaties van cliënten:

- PFN
- Senioren Netwerk Brabant en Zeeland (voorheen KBO-Brabant)

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners:

- NVT, NIV, NVKG, NOV

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders:

- ZN

**Contactinformatie:**

DICA

[indicatoren@dica.nl](mailto:indicatoren@dica.nl)

**Deze indicatorset is na toetsing opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Verplichte en eventuele vrijwillige indicatoren worden aangeleverd via het door de partijen gekozen aanleverportaal (gegevensmakelaar). Die faciliteert de route (aanlevering en publicatie) voor verplichte transparantie. De verplicht aangeleverde gegevens worden door Zorginstituut Nederland gepubliceerd.**

## Inhoud

1 Overzicht indicatoren	3
Alle indicatoren	3
Toelichting kolomkoppen	3
2 Algemene informatie	4
2.1 Uitgangspunten	4
2.2 Populatiebepaling	5
2.3 Aanlevering van de gegevens	5
2.4 Indicatorenwerkgroep	5
2.5 Externe partijen	5
3 Vast te leggen gegevens	6
4 Indicatoren	7
Indicator 1 indicatorvelden, rekenregels en definities	7
Indicator 2 indicatorvelden, rekenregels en definities	8
Indicator 3A1 indicatorvelden, rekenregels en definities	10
Indicator 3A2 indicatorvelden, rekenregels en definities	12
Indicator 3B1 indicatorvelden, rekenregels en definities	14
Indicator 3B2 indicatorvelden, rekenregels en definities	16
Indicator 4A1 indicatorvelden, rekenregels en definities	18
Indicator 4A2 indicatorvelden, rekenregels en definities	19
Indicator 4B1 indicatorvelden, rekenregels en definities	20
Indicator 4B2 indicatorvelden, rekenregels en definities	22
Indicator 5 indicatorvelden, rekenregels en definities	24
5. Wijzigingen	25
Nieuw of gewijzigd in indicatorenset	25
6 Bijlage: toelichting op informatie per indicator	26
Toelichting indicatorvelden, rekenregels en definities	26

## 1 Overzicht indicatoren

### Alle indicatoren

Indicator-nummer	Indicatornaam	Bron	Transparantie
1	Deelname	DHFA	Verplicht
2	Registratie functionele uitkomstscore voor opname en 3 maanden na ontslag	DHFA	Verplicht
3A1	Functionele uitkomst van patiënten volledig mobiel voor incident (mobiliteitsscore 1)	DHFA	Verplicht
3A2	Functionele uitkomst van patiënten mobiel met 1 hulpmiddel voor incident (mobiliteitsscore 2)	DHFA	Verplicht
3B1	Functionele uitkomst na 3 maanden van patiënten volledig mobiel voor incident (mobiliteitsscore 1)	DHFA	Verplicht
3B2	Functionele uitkomst na 3 maanden van patiënten mobiel met 1 hulpmiddel voor incident (mobiliteitsscore 2)	DHFA	Verplicht
4A1	KATZ-6 ADL score 0 voor het incident	DHFA	Verplicht
4A2	KATZ-6 ADL score 1 voor het incident	DHFA	Verplicht
4B1	KATZ-6 ADL score na 3 maanden bij score 0 voor het incident	DHFA	Verplicht
4B2	KATZ-6 ADL score na 3 maanden bij score 1 voor het incident	DHFA	Verplicht
5	Geriatrische medebehandeling	DHFA	Verplicht

### Toelichting kolomkoppen

- **Bron:** Vul hier de bron van de indicator in (bijvoorbeeld kwaliteitsregistratie X, EPD, ZIS, etc).
- **Transparantie:** Vrijwillige indicatoren worden niet opgenomen op de Transparantiekalender en dus niet aangeleverd aan en gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. Vrijwillige indicatoren worden gedeeld met de Zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties en Zorgaanbieders.

## 2 Algemene informatie

### 2.1 Uitgangspunten

De indicatoren zijn gebaseerd op de DHFA kwaliteitsregistratie.  
Aanlevering op ziekenhuisniveau/ZBC.

- Doel van deze indicatorset is:
  - o Interne sturing (waaronder leren & verbeteren)
  - o Verkrijgen van transparantie over verleende zorg (waaronder samen beslissen)
  - o Het afleggen van externe verantwoording
- Gepubliceerde transparante gegevens uit de openbare database zijn bedoeld voor, onder andere:
  - o Zorgaanbieders en zorgverleners
  - o Zorgverzekeraars
  - o Toezichthouders, waaronder de IGJ en NZa > indirect gezien overeenkomst IGJ indicatoren.
  - o Onderzoekers

De indicatoren zijn gebaseerd op:

- o Kwaliteitsstandaard, namelijk: onder andere:
  - Richtlijn proximale femurfracturen  
[https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/proximale\\_femurfracturen/proximale\\_femurfracturen\\_-\\_startpagina.html](https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-_startpagina.html)
- o (Internationale) Indicatorenset, namelijk:
  - Common dataset van het Fragility Fracture Network  
<https://www.fragilityfracturenetwork.org/>

## 2.2 Populatiebepaling

Voor alle indicatoren in deze indicatorenset bestaat de populatie uit:

Inclusie:

Alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH).

Exclusie:

- Patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte).
- Patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).

## 2.3 Aanlevering van de gegevens

Via [www.zorginzicht.nl](http://www.zorginzicht.nl) is het processchema te raadplegen voor de aanlevering van de gegevens behorende bij de indicatoren.

## 2.4 Indicatorenwerkgroep

De werkgroep voor het onderhoud van de indicatorset DHFA bestond in 2024 uit de volgende personen:

Clinical Audit Board van de DHFA:

Mw. Dr. E. Flikweert (voorzitter), namens de NVVH/NVT

Dhr. Dr. F. Malgo, namens NVKG

Mw. Dr. M. Trappenburg (Secretaris), namens de NIV

Dhr. P.W. van Egmond, namens de NOV

Dhr. Dr. M.J. Heetveld, namens de NVT

Mw. T. van Helmond, namens Senioren Netwerk Brabant en Zeeland (voorheen KBO-Brabant)

Mw. Drs. H.E. van Bremen, namens DICA

## 2.5 Externe partijen

Tevens waren de volgende personen aanwezig bij de ontwikkeldagen 2024:

T. van Helmond	Patientvertegenwoordiger DHFA
J. Oddens	CAB lid DPA
Y. Elshot	Amsterdam UMC
F. van den Eertwegh	CAB vz DMTR
S. Vergeer	ZN
R. van den Bergh	CAB lid DPA
E. Wolak	NFK
J. de Jong	St. Melanoom
R. Liem	CAB lid DATO
M.J. van den Boogaard	UMC Utrecht, voorzitter DCCA
A. van der Wal	VGZ

### 3 Vast te leggen gegevens

Om als zorgaanbieder deze indicatorset te kunnen aanleveren, moeten per cliënt de volgende gegevens (variabelen) worden vastgelegd:

De informatie over de vast te leggen gegevens voor deze indicatorenset zijn te vinden in de datadictionary van de DHFA op <https://support.mrdm.nl/registraties/dhfa/>

## 4 Indicatoren

In de bijlage staan alle velden in onderstaande indicatortabel toegelicht.

### Indicator 1 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Deelname
<b>Indicatornummer</b>	1
<b>Operationalisatie</b>	Aantal heupfracturen geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in de implementatie van de DHFA.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Implementatie DHFA monitoren.
<b>Type indicator</b>	Structuur
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Monitoren of zorginstellingen deelnemen aan de landelijke kwaliteitsregistratie DHFA.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Aantal
<b>Teller(s)</b>	Aantal heupfracturen geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.
<b>Noemer</b>	n.v.t.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Aantal; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-1-2026 t/m 31-12-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2017

## Indicator 2 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Registratie functionele uitkomstscore voor opname en 3 maanden na ontslag
<b>Indicatornummer</b>	2
<b>Operationalisatie</b>	Percentage patiënten waarbij de functionele uitkomstcores bij ouderen ( $\geq 70$ jaar) met een proximale femurfractuur voor opname en 3 maanden na ontslag is geregistreerd.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in de implementatie van de afname van de KATZ-ADL score en mobiliteitsscore in het ziekenhuis, bij opname en na 3 maanden.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Implementatie afname KATZ-ADL score en mobiliteitsscore in het ziekenhuis.
<b>Type indicator</b>	Proces
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Monitoren of zorginstellingen functionele uitkomstcores bepalen bij opname en 3 maanden na ontslag ten behoeve van een uitkomstindicator.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Percentage
<b>Teller(s)</b>	Aantal patiënten $\geq 70$ jaar met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score én de mobiliteitsscore**, beide bekend is preoperatief en drie maanden na ontslag***, ****.
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten $\geq 70$ jaar met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Percentage; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	<p>*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).</p> <p>**Categorieën van mobiliteitsscore volgens de Fracture Mobility Score:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobiel zonder hulpmiddel</li> <li>2. Buitenshuis mobiel met 1 hulpmiddel (bijvoorbeeld een stok)</li> <li>3. Buitenshuis mobiel met 2 hulpmiddelen of frame (bijvoorbeeld een rollator of looprek)</li> <li>4. Mobiel binnenshuis maar nooit naar buiten zonder hulp</li> <li>5. Geen functionele mobiliteit (gebruikmakend van onderste extremiteit)</li> <li>9. Onbekend</li> </ol> <p>***Patiënten die zijn overleden, worden wel geïncludeerd maar dienen te worden gescoord in de slechtste mobiliteitsscore (Mobility-score 5) en afhankelijkste niveau van functioneren (KATZ-ADL-score 6). Binnen de Dutch Hip Fracture Audit is geregeld dat de data van overleden patiënten niet worden ingevoerd, maar dat de scores aan de achterkant automatisch berekend worden als ingevoerd wordt dat de patiënt is overleden.</p> <p>****Voor de score na 3 maanden geldt een tijdsinterval van 10-16 weken postoperatief.</p>
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau



Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Registratie functionele uitkomstscore voor opname en 3 maanden na ontslag
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregel: zie teller/noemer Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

### Indicator 3A1 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst van patiënten volledig mobiel voor incident (mobiliteitsscore 1).
<b>Indicatornummer</b>	3A1
<b>Operationalisatie</b>	Percentage patiënten die volledig mobiel (mobiliteitsscore 1) waren voor het incident bij alle proximale femurfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in het aantal patiënten met een specifiek mobiliteitsniveau voorafgaand aan de fractuur, uitgedrukt in de mobiliteitsscore.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van het aantal patiënten per mobiliteitscategorie.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Inzicht in het aantal patiënten met een specifiek mobiliteitsniveau voorafgaand aan de fractuur, uitgedrukt in de mobiliteitsscore.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Percentage
<b>Teller(s)</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die volledig mobiel waren voor het incident (mobiliteitsscore 1**)
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis waarbij de mobiliteitsscore** is ingevuld voor het incident.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Percentage; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	<p>*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).</p> <p>**Categorieën van mobiliteitsscore volgens de Fracture Mobility Score:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobiel zonder hulpmiddel</li> <li>2. Buitenshuis mobiel met 1 hulpmiddel (bijvoorbeeld een stok)</li> <li>3. Buitenshuis mobiel met 2 hulpmiddelen of frame (bijvoorbeeld een rollator of looprek)</li> <li>4. Mobiel binnenshuis maar nooit naar buiten zonder hulp</li> <li>5. Geen functionele mobiliteit (gebruikmakend van onderste extremiteit)</li> <li>9. Onbekend</li> </ol>
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	<p>Inclusie: alle patiënten <math>\geq 70</math> jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH).</p> <p>Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).</p>
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	<p>Rekenregel: zie teller/noemer</p> <p>Geen casemixcorrectie</p>
<b>Databron</b>	DHFA

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst van patiënten volledig mobiel voor incident (mobiliteitsscore 1).
<b>(registratie)</b>	
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

### Indicator 3A2 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst van patiënten mobiel met 1 hulpmiddel voor incident (mobiliteitsscore 2).
<b>Indicatornummer</b>	3A2
<b>Operationalisatie</b>	Percentage patiënten die mobiel waren met 1 hulpmiddel (mobiliteitsscore 2) voor het incident bij alle proximale femurfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in het aantal patiënten met een specifiek mobiliteitsniveau voorafgaand aan de fractuur, uitgedrukt in de mobiliteitsscore.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van het aantal patiënten per mobiliteitscategorie.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Inzicht in het aantal patiënten met een specifiek mobiliteitsniveau voorafgaand aan de fractuur, uitgedrukt in de mobiliteitsscore.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Percentage
<b>Teller(s)</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die mobiel waren met 1 hulpmiddel voor het incident. (mobiliteitsscore 2**)
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis waarbij de mobiliteitsscore** is ingevuld voor het incident.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Percentage; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	<p>*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).</p> <p>**Categorieën van mobiliteitsscore volgens de Fracture Mobility Score:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobiel zonder hulpmiddel</li> <li>2. Buitenshuis mobiel met 1 hulpmiddel (bijvoorbeeld een stok)</li> <li>3. Buitenshuis mobiel met 2 hulpmiddelen of frame (bijvoorbeeld een rollator of looprek)</li> <li>4. Mobiel binnenshuis maar nooit naar buiten zonder hulp</li> <li>5. Geen functionele mobiliteit (gebruikmakend van onderste extremiteit)</li> <li>9. Onbekend</li> </ol>
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	<p>Inclusie: alle patiënten ≥70 jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH).</p> <p>Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).</p>
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	<p>Rekenregel: zie teller/noemer</p> <p>Geen casemixcorrectie</p>
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicator naam</b>	Functionele uitkomst van patiënten mobiel met 1 hulpmiddel voor incident (mobiliteitsscore 2).
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

### Indicator 3B1 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst na 3 maanden van patiënten volledig mobiel voor incident (mobiliteitsscore 1).
<b>Indicatornummer</b>	3B1
<b>Operationalisatie</b>	Gemiddelde categoriescore van de mobiliteitsscore na 3 maanden bij alle proximale femurfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder die voor het incident volledig mobiel waren (mobiliteitsscore 1).
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in de mobiliteit van de patiënt na 3 maanden met een specifiek mobiliteitsniveau voorafgaand aan de fractuur, uitgedrukt in mobiliteitsscore
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van mobiliteit bij 3 maanden van patiënten die voor het incident mobiel zonder hulpmiddel waren.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Waarborgen van kwaliteit van zorg door de functionele uitkomst drie maanden na de operatie te monitoren.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Gemiddelde
<b>Teller(s)</b>	De optelsom van alle mobiliteitsscore na 3 maanden van de patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident volledig mobiel waren (mobiliteitsscore 1**).
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident volledig mobiel waren (mobiliteitsscore 1**) en waarbij de mobiliteitsscore is ingevuld na 3 maanden***, ****.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Gemiddelde; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	<p>*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).</p> <p>**Categorieën van mobiliteitsscore volgens de Fracture Mobility Score:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobiel zonder hulpmiddel</li> <li>2. Buitenshuis mobiel met 1 hulpmiddel (bijvoorbeeld een stok)</li> <li>3. Buitenshuis mobiel met 2 hulpmiddelen of frame (bijvoorbeeld een rollator of looprek)</li> <li>4. Mobiel binnenshuis maar nooit naar buiten zonder hulp</li> <li>5. Geen functionele mobiliteit (gebruikmakend van onderste extremiteit)</li> <li>9. Onbekend</li> </ol> <p>***Patiënten die zijn overleden, worden wel geïncludeerd maar dienen te worden gescoord in de slechtste mobiliteitsscore (Mobility-score 5) en afhankelijkste niveau van functioneren (KATZ-ADL-score 6). Binnen de Dutch Hip Fracture Audit is geregeld dat de data van overleden patiënten niet worden ingevoerd, maar dat de scores aan de achterkant automatisch berekend worden als ingevoerd wordt dat de patiënt is overleden.</p> <p>****Voor de score na 3 maanden geldt een tijdsinterval van 10-16 weken postoperatief.</p>

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst na 3 maanden van patiënten volledig mobiel voor incident (mobiliteitsscore 1).
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregel: zie teller/noemer Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

### Indicator 3B2 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst na 3 maanden van patiënten mobiel met 1 hulpmiddel voor incident (mobiliteitsscore 2)
<b>Indicatornummer</b>	3B2
<b>Operationalisatie</b>	Gemiddelde categoriescore van de mobiliteitsscore na 3 maanden bij alle proximale femurfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder die voor het incident mobiel waren met 1 hulpmiddel (mobiliteitsscore 2).
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in de mobiliteit van de patiënt na 3 maanden met een specifiek mobiliteitsniveau voorafgaand aan de fractuur, uitgedrukt in mobiliteitsscore
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van mobiliteit bij 3 maanden van patiënten die voor het incident mobiel waren met 1 hulpmiddel.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Waarborgen van kwaliteit van zorg door de functionele uitkomst drie maanden na de operatie te monitoren.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Gemiddelde
<b>Teller(s)</b>	De optelsom van alle mobiliteitsscore na 3 maanden van de patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident mobiel waren met 1 hulpmiddel (mobiliteitsscore 2**).
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident mobiel waren met 1 hulpmiddel (mobiliteitsscore 2**) en waarbij de mobiliteitsscore is ingevuld na 3 maanden***,****.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Gemiddelde; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	<p>*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).</p> <p>**Categorieën van mobiliteitsscore volgens de Fracture Mobility Score:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobiel zonder hulpmiddel</li> <li>2. Buitenshuis mobiel met 1 hulpmiddel (bijvoorbeeld een stok)</li> <li>3. Buitenshuis mobiel met 2 hulpmiddelen of frame (bijvoorbeeld een rollator of looprek)</li> <li>4. Mobiel binnenshuis maar nooit naar buiten zonder hulp</li> <li>5. Geen functionele mobiliteit (gebruikmakend van onderste extremiteit)</li> <li>9. Onbekend</li> </ol> <p>***Patiënten die zijn overleden, worden wel geïncludeerd maar dienen te worden gescoord in de slechtste mobiliteitsscore (Mobility-score 5) en afhankelijkste niveau van functioneren (KATZ-ADL-score 6). Binnen de Dutch Hip Fracture Audit is geregeld dat de data van overleden patiënten niet worden ingevoerd, maar dat de scores aan de achterkant automatisch berekend worden als ingevoerd wordt dat de patiënt is overleden.</p> <p>****Voor de score na 3 maanden geldt een tijdsinterval van 10-16 weken postoperatief</p>



Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Functionele uitkomst na 3 maanden van patiënten mobiel met 1 hulpmiddel voor incident (mobiliteitsscore 2)
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregel: zie teller/noemer Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

**Indicator 4A1 indicatorvelden, rekenregels en definities**

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicatornaam</b>	KATZ-6 ADL score 0 voor het incident
<b>Indicatornummer</b>	4A1
<b>Operationalisatie</b>	Percentage patiënten met KATZ-6 ADL-score 0 voor het incident bij proximale femurpatiënten van 70 jaar en ouder.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzichtelijk maken van het aantal patiënten met een specifiek niveau van zelfstandigheid in dagelijkse bezigheden, uitgedrukt in de KATZ-6 ADL score.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van het aantal patiënten per KATZ-6 ADL score.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Percentage
<b>Teller(s)</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die een KATZ-6 ADL-score 0 hebben voor het incident.
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis waarbij de KATZ-6 ADL-score is ingevuld voor het incident.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Percentage; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregel: zie teller/noemer Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

**Indicator 4A2 indicatorvelden, rekenregels en definities**

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicatornaam</b>	KATZ-6 ADL score 1 voor het incident
<b>Indicatornummer</b>	4A2
<b>Operationalisatie</b>	Percentage patiënten met KATZ-6 ADL-score 1 voor het incident bij proximale femurpatiënten van 70 jaar en ouder.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzichtelijk maken van het aantal patiënten met een specifiek niveau van zelfstandigheid in dagelijkse bezigheden, uitgedrukt in de KATZ-6 ADL score.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van het aantal patiënten per KATZ-6 ADL score.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Percentage
<b>Teller(s)</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die een KATZ-6 ADL-score 1 hebben voor het incident.
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis waarbij de KATZ-6 ADL-score is ingevuld voor het incident.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Percentage; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregel: zie teller/noemer Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

**Indicator 4B1 indicatorvelden, rekenregels en definities**

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicatornaam</b>	KATZ-6 ADL score na 3 maanden bij score 0 het incident
<b>Indicatornummer</b>	4B1
<b>Operationalisatie</b>	Gemiddelde KATZ-6 ADL-score na 3 maanden bij alle proximale femurfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder die voor het incident een KATZ-6 ADL-score 0 hadden.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in het niveau van zelfstandigheid in dagelijkse bezigheden 3 maanden na de fractuur.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van veranderingen van patiënten in de KATZ-6 ADL score.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Waarborgen van kwaliteit van zorg door de functionele uitkomst drie maanden na de operatie te monitoren.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Gemiddelde
<b>Teller(s)</b>	De optelsom van alle KATZ-6 ADL-scores na 3 maanden van de patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident een KATZ-6 ADL-score 0 hadden.
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident KATZ-6 ADL-score 0 hadden en waarbij de KATZ-6 ADL-score is ingevuld na 3 maanden**, ***.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Gemiddelde; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3). **Patiënten die zijn overleden, worden wel geïnccludeerd maar dienen te worden gescoord in afhankelijkste niveau van functioneren (KATZ-ADL-score 6). Binnen de Dutch Hip Fracture Audit is geregeld dat de data van overleden patiënten niet worden ingevoerd, maar dat de scores aan de achterkant automatisch berekend worden als ingevoerd wordt dat de patiënt is overleden. ***Voor de score na 3 maanden geldt een tijdsinterval van 10 – 16 weken postoperatief.
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicatornaam</b>	KATZ-6 ADL score na 3 maanden bij score 0 het incident
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

## Indicator 4B2 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	KATZ-6 ADL score na 3 maanden bij score 1 het incident
<b>Indicatornummer</b>	4B2
<b>Operationalisatie</b>	Gemiddelde KATZ-6 ADL-score na 3 maanden bij alle proximale femurfractuurpatiënten van 70 jaar en ouder die voor het incident een KATZ-6 ADL-score 1 hadden.
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in het niveau van zelfstandigheid in dagelijkse bezigheden 3 maanden na de fractuur.
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Inzichtelijk maken van veranderingen van patiënten in de KATZ-6 ADL score.
<b>Type indicator</b>	Uitkomst
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: Richtlijn proximale femurfracturen Initiator: DHFA
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Waarborgen van kwaliteit van zorg door de functionele uitkomst drie maanden na de operatie te monitoren.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Gemiddelde
<b>Teller(s)</b>	De optelsom van alle KATZ-6 ADL-scores na 3 maanden van de patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident een KATZ-6 ADL-score 1 hadden.
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten met een proximale femurfractuur* geopereerd in het ziekenhuis die voor het incident KATZ-6 ADL-score 1 hadden en waarbij de KATZ-6 ADL-score is ingevuld na 3 maanden**,***.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Gemiddelde; één antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3). **Patiënten die zijn overleden, worden wel geïncludeerd maar dienen te worden gescoord in afhankelijkste niveau van functioneren (KATZ-ADL-score 6). Binnen de Dutch Hip Fracture Audit is geregeld dat de data van overleden patiënten niet worden ingevoerd, maar dat de scores aan de achterkant automatisch berekend worden als ingevoerd wordt dat de patiënt is overleden. ***Voor de score na 3 maanden geldt een tijdsinterval van 10 – 16 weken postoperatief.
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria</b>	Inclusie: alle patiënten $\geq 70$ jaar die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	1-9-2025 t/m 31-8-2026

<b>Veldnaam</b>	<b>Inhoud</b>
<b>Indicator naam</b>	KATZ-6 ADL score na 3 maanden bij score 1 het incident
<b>Aanleverfrequentie</b>	Eén keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2020

### Indicator 5 indicatorvelden, rekenregels en definities

Veldnaam	Inhoud
<b>Indicatornaam</b>	Gespecialiseerd behandelteam - geriatrische medebehandeling perioperatief
<b>Indicatornummer</b>	5
<b>Operationalisatie</b>	Percentage patiënten $\geq 70$ jaar waarbij de geriater/internist-oudengeneeskunde perioperatief in medebehandeling is geweest of intensieve medebehandeling op een afdeling geriatrische traumatologie
<b>Informatie voor cliënten</b>	Inzicht in aantal patiënten waarbij geriatrische medebehandeling heeft plaatsgevonden
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Uit onderzoek is gebleken dat intensieve betrokkenheid van klinisch geriater/internist-oudengeneeskunde zorgt voor betere patiëntuitkomsten
<b>Type indicator</b>	uitkomst / proces / structuur
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Document: behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Waarborgen van kwaliteit van zorg door de betrokkenheid van de geriater/internist-oudengeneeskunde te monitoren.
<b>Transparantie</b>	Verplicht
<b>Datatype</b>	Percentage
<b>Teller(s)</b>	Aantal patiënten $\geq 70$ jaar met een proximale femurfractuur* waarbij perioperatieve medebehandeling van een geriater of internist-oudengeneeskundige is geweest of intensieve medebehandeling op een afdeling geriatrische traumatologie
<b>Noemer</b>	Aantal patiënten $\geq 70$ jaar met een proximale femurfractuur*.
<b>Vraag</b>	n.v.t.
<b>Antwoordopties</b>	Percentage, een antwoord mogelijk
<b>Definitie</b>	*Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019 en 11.218), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
<b>Aggregatieniveau</b>	Locatieniveau
<b>In-/exclusiecriteria populatie</b>	Inclusie: alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH). Exclusie: patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte); patiënten met een periprothetische heupfractuur (fractuur rondom prothese of osteosynthese).
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregels: zie teller/noemer Geen casemixcorrectie
<b>Databron (registratie)</b>	DHFA
<b>Norm</b>	
<b>Meetperiode</b>	01-01-2026 t/m 31-12-2026
<b>Aanleverfrequentie</b>	Een keer per jaar
<b>Eerste aanleverdatum</b>	2024



## 5. Wijzigingen

Wijzigingstabel ten opzichte van de gids van verslagjaar 2025

### Nieuw of gewijzigd in indicatorenset

Indicatornummer (deze gids)	Type wijziging	Toelichting wijziging
	<input type="checkbox"/> Indicator is nieuw. <input type="checkbox"/> Indicatornummer is gewijzigd ten opzichte van de gids van vorig verslagjaar. <input type="checkbox"/> In de indicator zijn ter verduidelijking tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De berekening wijzigt niet ten opzichte van het vorig verslagjaar. <input type="checkbox"/> In de indicator zijn wijzigingen doorgevoerd die impact hebben op de berekening of definitie. Hierdoor kan de data niet meer vergeleken worden met de data van het vorige verslagjaar. Een nieuwe INID-code wordt hiervoor aangemaakt.	Geen wijzigingen

## 6 Bijlage: toelichting op informatie per indicator

### Toelichting indicatorvelden, rekenregels en definities

Term	Toelichting
<b>Informatie voor cliënten</b>	Het belang van en de betekenis van de indicator wordt hier kort zonder vaktermen verwoord. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg wat iets kan zeggen over de kwaliteit van zorg. In de informatie van cliënten wordt beknopt omschreven wat de indicator betekent en hoe deze geïnterpreteerd moet worden ('lager is beter', 'een instelling moet onder de norm van X scoren').
<b>Relevantie en toepasbaarheid</b>	Geef aan waarom de indicator relevant is en voor wie.
<b>Type indicator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitkomst</li> <li>- Proces</li> <li>- Structuur</li> </ul>
<b>Achtergrond van de indicator</b>	Op basis waarvan is de indicator opgesteld? Verwijs naar een richtlijn/standaard, of een internationale indicatorset waarin de indicator ook is opgenomen. Dit vergroot de validiteit van de indicator: zegt deze indicator echt iets over kwaliteit van zorg?
<b>Doel van het meten en publiceren</b>	Beschrijf wat beoogd wordt met het meten en publiceren. Geef aan voor welke fase in het zorgproces de indicator relevant is; eventueel voor welke type zorginstelling. Geef ook aan – waar van toepassing - in welke situatie de indicator niet langer relevant is.
<b>Transparantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verplicht (publicatie in Openbare Database van Zorginstituut Nederland)</li> <li>- vrijwillig (geen openbare publicatie. Doorlevering alleen naar patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders)</li> </ul>
<b>Datatype</b>	Het datatype dat moet worden aangeleverd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tekst (vrije tekst of een keuze uit een lijst in de indicatorgids)</li> <li>- ja/nee</li> <li>- aantal (een geheel getal)</li> <li>- getal</li> <li>- percentage (een getal tussen 0 en 100. Teller/noemer *100)</li> </ul>
<b>Teller(s)</b>	Het getal boven de streep van een breuk. De teller is altijd een deelverzameling van de noemer. Om lange formuleringen te vermijden, is de volledige omschrijving van de deelverzameling niet altijd herhaald in de teller.
<b>Noemer</b>	Het getal onder de streep van een breuk. Nauwkeurige beschrijving van de cliëntenpopulatie. Indien er sprake van een structuurindicator is, dan is noemer niet van toepassing.
<b>Vraag</b>	Wanneer er een vraag wordt gesteld over de organisatie van de zorg (vaak een klantpreferentievraag), dan kan de vraag aan de instelling hier geplaatst worden. De operationalisatie is dan hoe de indicator wordt gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Vraag: "Op welke manier kunnen patiënten na de operatie

Term	Toelichting
	contact opnemen bij vragen?" Operationalisatie: "Aangeboden manieren post-operatief contact"
<b>Antwoordopties</b>	Bij vragen is het belangrijk aan te geven of er slechts één antwoord mogelijk is of meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast moeten de antwoordopties vermeld worden.
<b>Definitie</b>	Indien in de indicator termen worden gebruikt die enige toelichting nodig hebben, zodat betrouwbaar kan worden geregistreerd, dan wordt een definitie gegeven.
<b>Aggregatieniveau</b>	Het niveau waarop de indicatoren worden aangeleverd; in beginsel worden alle indicatoren op locatieniveau aangeleverd. In de uitgangspunten in de indicatorgids wordt voor de hele set aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan. Per indicator kunnen specifieke aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld voor proces- en uitkomstindicatoren afkomstig uit kwaliteitsregistraties op concernniveau.
<b>In-/exclusiecriteria populatie</b>	Een duidelijke definiëring van de cliëntenpopulatie vertaalt zich uiteindelijk in duidelijke in- en exclusiecriteria. Daarnaast kunnen exclusiecriteria gebruikt worden om vergelijkbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld als bepaalde cliëntengroepen niet gelijk over instellingen zijn verdeeld.
<b>Rekenregels en casemixcorrecties</b>	Rekenregels voor het berekenen van de indicatorwaarde. Wanneer het relevant is voor een indicator kunnen cliëntkenmerken gebruikt worden voor het corrigeren van de indicatorwaarde. Hier moet worden aangegeven of er een casemixcorrectie plaatsvindt en op welke variabelen.
<b>Databron (registratie)</b>	De te gebruiken bron voor het berekenen van de indicatorwaarde. Bijvoorbeeld: LROI, NKR, DLCA-R, EPD, Zorgkaart Nederland
<b>Norm</b>	Als de indicator een norm kent, wordt deze hier in de indicatorgids vermeld. Ook de bron van de norm wordt vermeld.
<b>Meetperiode</b>	De meetperiode is de periode waarin de metingen worden gedaan. Dit is standaard het hele kalenderjaar (01-01 t/m 31-12), maar hier kan van worden afgeweken. Bij follow-upmetingen moet een expliciete keuze worden gemaakt: een meting drie maanden post-operatief binnen het verslagjaar betekent dat de operatie ook in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar kan zijn uitgevoerd. Soms wordt er een peildatum gebruikt in plaats van een meetperiode (vaak bij structuurindicatoren). De peildatum ligt dan vaak op 01-03 van het jaar ná het verslagjaar.
<b>Aanleverfrequentie</b>	De frequentie waarmee de indicatoren aangeleverd worden. Afspraken over de frequentie worden landelijk gemaakt. Dit is momenteel één keer per jaar.
<b>Eerste aanleverdatum</b>	Geef aan op welke datum deze versie van de indicator bij het Zorginstituut moet worden aangeleverd. Deze datum wordt opgenomen op de Transparantiekalender.