

## Midline (Hoofd-Hals, Thorax, Genitaal gebied)

Aanvraagformulier compressiehulpmiddelen en toebehoren



### LET OP:

download eerst dit bestand voordat je het invult.

### Type compressiehulpmiddel (keuzes)

meerdere antwoorden mogelijk

Zwachtel/bandage

GPD

ACD

HH

Thorax

Polster / pelotten / PPD

Anders:

Toelichting (verplicht):

### Aangedane lichaamslocatie

meerdere antwoorden mogelijk

Hoofd / Hals

Thorax / Borst

Buik

Genitaal gebied

Links

Rechts

Beiderzijds

Niet van toepassing

### Verstrekking

Machtiging

Datum laatste levering

### Draagadvies

Draagduur

< 3 weken

> 3 weken -< 6 mnd

> 6 mnd

Anders:

Tijdstip

Dag

Nacht

Dag en Nacht

### Stadium en reden aanvraag

Stadium

Initiële fase (reductiefase / behandelfase)

Consolidatie fase (onderhoudsfase)

Reden (meerdere antwoorden mogelijk)

Aanvullend te dragen bij:

Anders:

Toelichting (verplicht):

## Status

meerdere antwoorden mogelijk

Oedeem is stabiel  
Oedeem fluctueert  
Recidiverende erysipelas  
Fibrose aanwezig  
Littekens aanwezig  
Anders:

## Welke behandelingen worden er, naast de inzet van compressiehulpmiddelen, ingezet?

meerdere antwoorden mogelijk

(Manuele) lymfedrainage  
Endermologie  
Bewegingstherapie  
Participatie bevorderen (werk / sociaal)  
(I)PC  
Zwachtelen / bandages  
Interventies bevordering zelfmanagement  
Anders:

## Doel van de inzet van het compressiehulpmiddel

meerdere antwoorden mogelijk

Vermindering aantal behandelingen  
Stabiele situatie behouden/bereiken  
Zelfredzaamheid bevorderen  
Reduceren oedeem  
Voorkomen recidief  
Mobilisatie:

Anders:

Vermindering thuiszorg  
Pijnvermindering  
Verbeteren bloed-/lymfecirculatie / afvoer  
Consolidatie oedeem  
Functioneren in de maatschappij bevorderen

## Heeft er nader onderzoek plaatsgevonden door de verwijzer

meerdere antwoorden mogelijk



**Let op!** Onderstaand antwoord(en) is (zijn) géén reden voor afwijzing van de aanvraag

De eerste stap op weg naar een doeltreffende en doelmatige verstrekking van compressiehulpmiddelen is een duidelijke indicatiestelling, zodat de cliënt die compressiehulpmiddelen nodig heeft, ook daadwerkelijk het juiste hulpmiddel geleverd krijgt.

De arts, verpleegkundig specialist of physician assistant vertaalt zijn/haar bevindingen in een functioneringsgerichte verwijzing. Bij enkele indicaties is er nader onderzoek gewenst. Hieronder is een aantal onderzoeksmethoden weergegeven.

## Onderzoek

meerdere antwoorden mogelijk

Lymfscintigrafie  
Fluoroscopie  
Anders:

Géén onderzoek bekend

## Verantwoording: incl. stepped care

### Medische indicatie

*meerdere antwoorden mogelijk*

Morbus Morbihan

Anders:

Lipoedeem (geen Zvw aanspraak)

Lymfoedeem

Primair lymfoedeem

Secundair lymfoedeem

Oncologische oorzaak

Trauma

Anders:

### Relevante comorbiditeiten o.a.

*meerdere antwoorden mogelijk*

Decompensatio Cordis

Nierinsufficiëntie

Wond

Bacteriële infecties

Anders:



Zie voor meerdere comorbiditeiten bijlage 9 Module Compressiehulpmiddelenzorg (Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg)

### Andere complicerende factoren

*meerdere antwoorden mogelijk*

Ernstige mate van deformatie

Pijn

Meerdere locaties

Krachtverlies

Beperkingen in fysieke activiteiten

Mentale stoornissen

Andere complexiteit(en):

Toelichting (verplicht):

## Door wie wordt het compressiehulpmiddel aangebracht?

*meerdere antwoorden mogelijk*

Zelfstandig  
Wijkverpleegkundige  
Wondverpleegkundige / -consulent  
Mantelzorg  
Verzorgende / thuiszorg  
Anders:

## Welke zorgprofessionals zijn betrokken (geweest)?

*meerdere antwoorden mogelijk*

Huisarts / Medisch specialist  
Wijkverpleegkundige  
Wondverpleegkundige / -consulent  
Oncologisch verpleegkundige  
Compressie-therapeut / Bandagist  
Oedeem fysiotherapeut  
Huid- en oedeemtherapeut  
Anders:

## Stepped care vragen: Waarom kan niet worden volstaan met (traditioneel) zwachtelen?

*meerdere antwoorden mogelijk*

Zwachtelen niet mogelijk door vorm, zwachtels zakken  
Zwachtelen is te arbeidsintensief bij deze cliënt  
omdat:

Duur en frequentie van zwachtelsessies beperken  
omdat:

Zwachtelen te pijnlijk  
omdat:

Toelichting (verplicht):



Hoeft alleen te worden  
ingevuld in de Initiële fase

Sneller resultaat / snellere genezing / bereiken stabiele situatie  
Zorg is niet (voldoende) beschikbaar  
Te langdurig zwachtelen (3-6 weken)  
Locatie is niet geschikt  
Anders: